63ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

27–29 Ιουνίου 2025

Ξενοδοχείο
RODOS PALACE
Ρόδος







ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
EVEREST TRAVEL & CONGRESSES
Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
T: 2103249242
W: www.everesttravel.gr
E: conference@everesttravel.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μπακοπούλου 15, 15451, Ν. Ψυχικό
T: 2107771140
W: www.e-child.gr
E: grammateia@e-child.gr

ΕΑ61

Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ (RSV) ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ- ΑΝΑΛΥΣΗ

Δανάη Κ. Γιαβάσογλου[1], Μαρία Μ. Μπερικοπούλου[1], Ηλίας Γκούντας[2], Αθανάσιος Μίχος[3]
[1] Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
[2] MSD Ελλάδος, Αθήνα
[3] Α' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

Εισαγωγή: Ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός (RSV) αποτελεί κύριο παθογόνο στα παιδιά, κυρίως κάτω των 5 ετών. Η πανδημία COVID-19 επηρέασε την επιδημιολογία του RSV.
Σκοπός: Η μελέτη της επιδημιολογίας του RSV σε νοσηλευόμενα παιδιά στην Ευρώπη, όπως διαμορφώθηκε μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων του COVID-19.
Υλικό: Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών PRISMA.
Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση σε τρεις βάσεις δεδομένων (PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science) από 01/01/2021 έως και 31/10/2024. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν έρευνες με νοσηλευόμενα παιδιά ηλικίας 0-18 ετών, που διενεργήθηκαν στην Ευρώπη. Για τη μετα-ανάλυση εφαρμόστηκε μοντέλο τυχαίων επιδράσεων. Η ετερογένεια εκτιμήθηκε με τη μέθοδο I^2 και το σφάλμα δημοσίευσης με διαγράμματα χοάνης και τεστ Egger.
Αποτελέσματα: Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 31 μελέτες με πληθυσμό 89.466 παιδιών. Η συνολική θετικότητα του RSV ήταν 37% (95%CI: 31%-44%), με αυξημένο επιπολασμό 71% (95%CI: 63%-79%) στις μελέτες που αφορούσαν βρέφη <12 μηνών, έναντι 26% (95%CI: 22%-32%) σε εκείνες με μεγαλύτερα παιδιά (0-18 ετών). Μελέτες από την Νότια Ευρώπη κατέγραψαν υψηλότερο ποσοστό ενδονοσοκομειακής RSV θετικότητας (40%, 95%CI: 27%-53%), συγκριτικά με άλλες περιοχές (31%, 95%CI: 25%-37%). Μεταξύ των θετικών RSV παιδιών, το 12% (95%CI: 8%-16%) χρειάστηκε νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ συλλοιμώξεις ανευρέθησαν στο 17% (95%CI: 10%-24%).
Συμπεράσματα: Μετά την πανδημία COVID-19, παρατηρήθηκε αυξημένη RSV θετικότητα, ιδιαίτερα σε παιδιά <12 μηνών. Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατα διαθέσιμες στρατηγικές πρόληψης του RSV, όπως τα μονοδοσικά μονοκλωνικά αντισώματα και τα εμβόλια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης είναι απαραίτητο για τη λήψη αποφάσεων δημόσιας υγείας.